I NOSTRI CONSIGLI



€ 8,70

NAZAR

Decongestionante nasale in corso di riniti e faringiti acute catarrali, di riniti allergiche, di sinusiti acute

Spray da 15ml



€ 16,80

BIOSTERINE ALLERGY
AREMEDY

Integratore alimentare arricchito con Biosterine® che favorisce l'equilibrio fisiologico in caso di fastidi legati ad allergia

30 compresse



€ 11,20

Euphralia
ALLERGY

Collirio che attenua i sintomi della congiuntivite allergica stagionale, anche quando associata alla sindrome da occhio secco.

gocce oculari 10ml



€ 8,50

imidazyl
ANTISTAMINICO

Per trattare le allergie e le infiammazioni dell'occhio (congiuntiva), caratterizzate da senso di bruciore, causato anche da agenti esterni, associato ad eccessiva lacrimazione, fastidio alla luce, arrossamento

10 monodose da 0,5ml

Questo documento ha l'obiettivo di fornire al paziente semplici e chiare informazioni riguardanti le allergie non è in alcun modo da intendersi come sostitutivo di un parere medico.



in farmacia
FARMANETWORK

ALLERGIA
CONOSCERLA PER PREVENIRE

DAL 1° AL 12 APRILE
ritira il
"CALENDARIO DEI POLLINI ALLERGENICI"

... c'è differenza tra curarsi e prendersi cura di sè ...

è un'iniziativa del Consorzio InFarmacia Farmanetwork

www.infarmanetwork.it consorzioinfarmacia

ALLERGIA

UN ERRORE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

L'allergia è una reazione di difesa esagerata del sistema immunitario di fronte a sostanze considerate erroneamente nocive. L'errore avviene nella prima fase di confronto, cioè la sostanza estranea non solo viene riconosciuta come non compatibile con l'organismo, ma viene anche "ingigantita" per quanto riguarda la sua pericolosità. Ecco che allora il sistema immunitario da un lato memorizza l'agente estraneo e dall'altro costruisce un numero eccessivo di anticorpi pronti a reagire massicciamente qualora si ripresentasse un nuovo contatto (processo di sensibilizzazione).

TERAPIE

PREVENTIVA

La terapia farmacologica preventiva si basa essenzialmente sull'assunzione di cromoni, che diminuiscono la sensibilità dell'apparato respiratorio nei confronti del polline allergenico.
L'inizio della terapia preventiva dovrebbe avvenire da due a quattro settimane prima della stagione di fioritura tipica della specie botanica che rende suscettibile il paziente allergico.
In seguito, il trattamento va proseguito per tutto il periodo a rischio, con assunzioni regolari del farmaco indicato.

SINTOMATICA

I decongestionanti: utilizzati per un sollievo rapido e temporaneo alla congestione nasale e sinusale, al rossore e al prurito agli occhi; contengono vasocostrittori, sostanze che riducono l'irrorazione sanguigna della mucosa del naso e degli occhi, alleviando i sintomi.

Gli antistaminici: bloccano l'attività dell'istamina, una delle principali sostanze chimiche infiammatorie, rilasciate dal sistema immunitario, che intervengono nelle manifestazioni allergiche. Di conseguenza, si assiste al miglioramento dei principali sintomi dell'allergia.

Gli antileucotrieni: questi farmaci hanno un'azione specifica contro i recettori dei leucotrieni, sostanze infiammatorie che sono liberate dai mastociti durante la reazione allergica. In pratica, impediscono ai leucotrieni di svolgere la loro funzione, bloccano così la risposta infiammatoria e limitano i sintomi dell'allergia come l'eccessiva produzione di muco nasale.

SINTOMI



OCULARI

- congiuntivite allergica
- lacrimazione profusa (a volte irritante);
- prurito alle congiuntive;
- fotofobia (fastidio alla luce).



RESPIRATORI

Associati alla progressiva evoluzione della rinite allergica in asma bronchiale comprendono:

- difficoltà respiratoria;
- tosse secca e stizzosa;
- sibili intratoracici;
- crisi di tipo asmatico.



NASALI

- starnuti ripetuti;
- prurito in corrispondenza del naso o del palato;
- secrezione abbondante e di colore chiaro;
- naso chiuso.

RINITE ALLERGICA

La rinite è una reazione allergica infiammatoria delle prime vie respiratorie, che si manifesta principalmente a carico della mucosa del naso, interessando anche gli occhi. Nella sua variante allergica, la rinite può occorrere come conseguenza all'inalazione dei pollini allergenici. La forma stagionale, detta anche "febbre da fieno" (impropriamente, perché in realtà non è associata a stato febbrile) può comparire a qualsiasi età.
La rinite allergica si manifesta con alcuni sintomi caratteristici: starnuti consecutivi, naso chiuso e "gocciolante", irritazione alla gola, prurito al naso, mal di testa ecc.

ASMA BRONCHIALE

L'asma bronchiale è una malattia infiammatoria su base allergica dovuta all'inalazione di allergeni, caratterizzata da un'ostruzione delle vie respiratorie e da un aumento della responsività a livello dei bronchi. La severità dei sintomi dell'asma varia da caso a caso.
La malattia si manifesta con crisi respiratorie: episodi improvvisi e graduali in cui la mucosa dei bronchi si ispessisce, la muscolatura che li avvolge si contrae e il passaggio dell'aria è reso più difficoltoso. Il paziente asmatico, di conseguenza, è soggetto a difficoltà nella respirazione, tosse, senso di costrizione toracica e respiro sibilante.



CALENDARIO
dei principali POLLINI ALLERGENICI

La reazione allergica causata dai pollini si presenta con ricorrenza stagionale, in corrispondenza del periodo di pollinazione caratteristico per ogni specie responsabile dell'allergia.

Per questo motivo, il paziente deve conoscere quali sono gli antigeni pollinici che lo rendono suscettibile, dove sono localizzate nel territorio le piante che li producono e quali sono le conseguenze allergiche che ne possono derivare.


MESI
G F M A M G L A S O N D
GRAMINACEE
NORD
CENTRO
SUD
ASTERACEE COMPOSITE
NORD
CENTRO
SUD
PARIETARIA
NORD
CENTRO
SUD
BETULACEE
NORD
CENTRO
SUD
CUPRESSACEE
NORD
CENTRO
SUD
OLEACEE
NORD
CENTRO
SUD
PLATANACEE
NORD
CENTRO
SUD